

• **DICTIONNAIRE**
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE.

ATLAS.

TOME III.

ИСТОРИЯ

СЛАВЯНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

ЧАСТЬ I

DICTIONNAIRE
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE

DU 10^E

PAR M. CHARLES D'ORBIGNY.

—
ATLAS.
—

ZOOLOGIE.

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, Cirrhipèdes, Vers,
Mollusques et Zoophytes.

BOTANIQUE.

Plantes, Acotylédonnées, Monocotylédonnées
et Dicotylédonnées.

—○○○○○○○○—
TOME TROISIÈME.
—○○○○○○○○—

PARIS,

CHEZ LES ÉDITEURS MM. RENARD, MARTINET ET C^{ie},
RUE ET HOTEL MIGNON, 2 (quartier de l'École-de-Médecine).

ET CHEZ

LANGLOIS ET LECLERCQ,
Rue de la Harpe, 81.

VICTOR MASSON,
Place de l'École-de-Médecine, 17.

Mêmes maisons, chez F. Michelsen, à Leipzig.

1849.

24
13
064
1847
Atlas
E.3
3NHRB

DEPARTMENT



D'HISTOIRE NATURELLE

ATLAS


PLANCHE

FIGURE

1847



- CHILOGNATHES. { 1. *Glomeris bordes*. (*Glomeris marginata*, Leach.)
 2. *Julus lucifugus*. (*Julus lucifugus*, Germ.)
 3. *Polydème du Mexique*. (*Polydesmus mexicanus*, Lucas.)
 CHILOPODES. 4. *Scolopendre mordante*. (*Scolopendra morsitans*, Lin.)




Vaillant delar

Lebrun sc

1 *Mygale de Quoy* (*Mygale quoyi*, Muls.) 2. *Scytodes thoracique*. (*Scytodes thoracica*, Latr.) grossie.


2^a La même de grandeur naturelle.



Blanchard pinx.

Corbuc sc.


1. *Mygale avicularia*. (*Mygale avicularia*, Linn.) — 2. *Nid de la Mygale macrura* (*Mygale carmentaria*)



1. *Scorpion africain*. *Scorpio (Buthus) Afric.* Linn.

a, b, c, d, e. *Détails du Scorpion Africain*.

Langlois. imp.



Fontaine

Lupée plagiatus. (Lupa pelagica, Lin.)

Bollia imp.

Blanchard pinx.




Toulet pinx.

Sourmer sc.

Birgus setosus. (Birgus latro. Fabr.)


Linnaeus imp.



Vaillant. pinx.

Poultier. sculpsit.

Homard commun (*Homarus vulgaris*, Edw.) $\frac{1}{2}$ de gr. nat.






Blanchard pinx.

Fournier sc.


Palaemon ornatus. (*Palaemon ornatum*, Oliv.)



Standard print.

Louvier sc.

Squilla maculata. (*Squilla maculata*, Latr.)




Martin. S^t Ange. pinx.


Chouard. sc.

1. *Anatifa lissa*. (*Anatifa laevis*, Latk.)

2-9 Anatomie des Anatifes.



VERS
AUXÉLIDES } 1. *Eumolpe peinte* (*Eumolpe picta*, V.) 1.^b grandeur nat. 2. *Syllis tachee* (*Syllis maculata*, B.) 2.^b gr. nat.
 3. *Serpule contorturée* (*Serpula contortuplicata*, L.) 4. *Spirorbe nauticole* (*Spirorbe nauticoles*, Lamk.)
 4.^b Portion de fucus chargée de spirorbes de grand. nat. 5. *Clepsine sexoculata* (*Clepsine sexoculata*, Desf.)
TURBELLARIÉS
HELMINTHES-
TREMATODES } 6. *Eolidière de Broechii* (*Eolidiceros Broechii*, Risso.) 6.^b grand. nat. 7. *Distome lanceolé*
 (*Distomum lanceolatum*, Mchler.) 7.^b grand. nat. 8. *Polysystème des grenouilles* (*Polystomum integrinum*, Rad.)
 8.^b grandeur naturelle.



Pierre quoy.


Fouquier sc.

1. *Histioteuthis de Bonelli.* (*Histioteuthis Bonelliana*, *Mé. d'orb.* ;

CÉPHALOPODES. *Cranchia Bonelliana*, *Féruss.*) — 1.^a 1.^b Mandibules ou armure de la bouche.

2. *Poulpe commun.* (*Octopus vulgaris*, *Lamb.*)

Lamouzeux imp.



1. 2. *Patelle commune.* (*Patella vulgata*, Lin.) — 3. 4. *Fissurelle en bateau.* (*Fissurella nimboza*, L.)
 5. *Calyptre scabre.* (*Calyptrea equestris*, L.) — 6. *Culochon bonnet hongrois.* (*Pileopsis hungarica*, L.)
 7. *Dentale elephantine.* (*Dentalium elephantinum*,) — 8. *Psidium circulaire.* (*Chiton squamosus*, Lin.)



Mouster pine.

Legrand scalp.


GASTEROPODES. { 1. *Vermet d'Adanson* (*Vermetus lubricalis*, Lamk.) = 2. *Magile antique*.
 (Magilus antiquus, Lamk.) = 3 et 4. *Scalaira courvini*: (*Scalaria coronata*, Lamk.)
 5. *Turbo rubani*: (*Turbo petiolatus*, Lin.) = 6 et 7. *Helicotide rayonnee* (*Haliois radiata*, Prod.)




Mouvier. pinx.

Peillard. sc.

1, 2. *Melanie bengale*. (*Melania atra*, Desh.) = 3, 4. *Paludine du Bengale* (*Paludina Bengalensis*, Lank.) = 5, 6. *Tornatelle bicard*. (*Tornatella flammea*, Lank.) = 7, 8. *Pyramidelle tachetée*. (*Pyramidella maculosa*, Lank.) = 9, 10. *Janthine commune*. (*Janthina communis*, Lank.)




1. *Aplysia punctata*: (*Aplysia punctata*, Lam.) - 2. 3. *Sigaret depressus*: (*Sigaretus haliotoides*, Lam.)
 4. 5. *Natica flammaria*: (*Natica caurena* Zt.) - 6. 7. 8. *Bulla bandedolli*: (*Bulla aplustre*, Lin.)
 9. *Ombrelle de la méditerranée*: (*Umbrella mediterranea*, Lam.)



Prêtre, p. 100

L'ournier, sc

1, 2. *Helix rochiformis*. (*Helix epistylum*, Mull.)—3, 4. *Helix mucronata*. (*Helix vittata*, Mull.)
 5, 6. *Helix sinuata*. (*Helix sinuata*, Mull.)—7, 8. *Helix multicolor*. (*Helix polychroa*, Swain.)
 9, 10. *Helix Pyramidella*. (*Helix Pyramidella*, Wagner)—11, 12, 13. *Helix de Lister*. (*Helix Listeriana*, Gray.)
 14, 15, 16. *Helix polygona*. (*Helix polygona*, Swain.)



Prêtre, pinx.

Fournier, sc.

1, 2. *Bulime de Mender.* (*Bulimus Menderensis, Brod.*)—3, 4 *Bulime turin.* (*Bulimus signatus, Wagn.*)
 5, 6. *Bulime pudique.* (*Bulimus pudicus, Muller.*)—7, 8. *Bulime pentagrad.* (*Bulimus pentagræctinus.*)
 9, 10. *Bulime rougeur.* (*Bulimus exesus, Spix.*)—11, 12. *Millet chrysalide.* (*Pupa Chrysalis, Fer.*)



Neritina

Logranul

1. *Neritina tuberculosa*. (*Neritina nodosa*, Def.) — 2. *Cerithium chenille*. (*Cerithium aluco*, Desig.)
 3. *Turbinella peire*. (*Turbinella pyriformis*, Lamk.) — 4. *Cancellaria obtusa*. (*Cancellaria obtusa*, Desig.)
 5. *Fusca longirostris*. (*Fusca longirostris*, Desig.) — 6. *Palma rose*. (*Murex palma rose*, Lamk.)





noire pur.

legrand. s.

1. *Strombe variable*. (*Strombus variabilis*, *Sauv.*) — 2. *Concholeptus du Peru*. (*Concholeptus Peruvianus*, *Lamk.*)
 3. *Ricinusle digite*. (*Ricimula diginata*, *Lamk.*) — 4. *Sicorne terre epaisse*. (*Monoceros crassilabrum*, *Lamk.*)
 5. *Rostellaire arc-en-ciel*. (*Rostellaria curvirostris*, *Lamk.*) — 6. *Cassite sibre*. (*Cassitis undata*, *Martini*)
 7. *Sourpice persique*. (*Purpura persica*, *Lamk.*)



1



2



3



4



5



6



7



8

Prêtre pinx.

Boutinier sc.

1. *Colombella grande*. (*Colombella major*, Sw.) — 2, 3. *Buccin arcuatum*. (*Buccinum arcularia*, Linn.)
 4. *Voluta edulis*. (*Voluta undulata*, Lamk.) — 5. *Vis zebra*. (*Terebra striata* Sw.) — 6. *Conus imperialis*
 (*Conus imperialis*, Linn.) — 7. *Harpa ventricosa*. (*Harpa ventricosa*, Lamk.) — 8. *Buccin melanostoma*
 (*Buccinum melanostoma*, Sw.)



1



2



4

5



5



7



6



9

Perseus




8



10

Tournefort

1. *Ancillaria borbis* (*Ancillaria marginata*, Lamb.) — 2, 3. *Volvaria hyalina* (*Volvaria pallida*, Lamb.)
 4. *Marginella d'Adanson* (*Marginella Adansoni*, Römer.) — 5. *Mitra scabriscula* (*Mitra scabriscula*, L.)
 6. *Caricis subulati* (*Terebellum subulatum*, Lamb.) — 7, 8. *Ovula intermedia* (*Ovula*, Sw.)
 9. *Olive du Pérou* (*Olivea Peruviana*, Lamb.) — 10. *Perelaine buffonne* (*Cyprata seurea*, Chemn.)



Tridacna pusa.

Fourcraie so.

1 a et 1 b. *Pholade dactyle*. (*Pholas dactylus*, Lin.) — 2 a et 2 b. *Solen siliqua*. (*Solen siliqua*, Lin.)

3. *Arrosoir de Java*. (*Aspergillum Javanum*, Lamk.) — 4 a et 4 b. *Glycimeris siliqua*. (*Glycimeris siliqua*, Lamk.)

5 a et 5 b. *Taret commun*. (*Teredo navalis*, Lin.)




Prêtre pinx.

Fournier sc.

1 a et 2 b. *Gnathodon cuneiforme*. (*Gnathodon cuneatus*, Gray) — 2 a et 2 b. *Crassatelle rostrée*. (*Crassatella rostrata*, L^h)
 3 a et 3 b. *Mya tronquée*. (*Mya truncata*, Lin.) — 4 a et 4 b. *Mactre mouchetée*. (*Mactra maculosa*, Lamk.)
 5 a et 5 b. *Anatina tronquée*. (*Anatina truncata*, Lamk.) — 5 c. Charnière de l'*Anatina* montrant le ligament
 et son osselet.



1, 2. *Galathée à rayons* (*Galathea radiata*, Lamk.) = 5, 4. *Cyprine cordiforme* (*Cyrena cordiformis*, Desh.)
 3, 6. *Astarte d'Islande* (*Astarte Islandica*, Desh.) = 7, 8, 9. *Cyclade des rivières* (*Cyelas rivicola*, Lamk.)



1, 2. *Buccarde géante*. (*Cardium magnum*, Linn.) 3, 4. *Ethérie plumbée*. (*Ethéria plumbea*, Fer.)
 5, 6. *Tridacne pâlissante*. (*Tridacna squamosa*, Lamk.) 7, 8. *Corne Corne de Luin*. (*Chama danacorus*, Lamk.)

Ferussac pinx.


Am. Douville sculp.



Dejean pinx.

Soulier sc.


1.2. *Lime coralline*. (*Lima squamosa*, Lamk.) 3.4. *Spondyle safranée*. (*Spondylus crocatus*, Desh.)
 5. *Huitre feuille*. (*Ostrea folium*, Lamk.) 6. 7. *Pecten tigré*. (*Pecten tigris*, Lamk.)



Prétre pass.

Poupartier sc.


1. 2. *Cheridée rayonnante* (Thecidea radians, Def.) 3. 4. *Callicola sandalina* (Calceola sandalina, Lamk.)
 5. 6. *Cirratula tya* (Terebratula tya, Lamk.) 7. *Cirratula lenticularis* (Terebratula lenticularis, Peds.)
 8. 9. *Anomia pelosa* (Anomia ephippium, Linn.) 10. *Productus antiquatus* (Productus antiquatus, Linn.)
 11. 12. *Cirratula de Savi* (Terebratula Savi, Boettger)



ECHINODERMES.

ECHINIDES.

1. *Cidarites imperiale*. (*Cidarites imperialis*, Lank.) — 1^c Le même dépouillé de ses piquants.
2. *Oursin artichaut*. (*Echinus atratus*, Linn.; *Echinomelva atrata*, St.) — 3. *Oursin globiforme*. (*Echinus globiformis*, Lank.) — 4. *Scutelle radiée*. (*Scutella radiata*, Blainv.) — 4^c La même vue en dessous. — 4^b La même vue de côté. — 5. *Scutelle à cinq trous*. (*Scutella quinquefora*, Lank.)
6. Piquant de l'Oursin mamelonné. — 6^c Piquants de divers Oursin.



Fournier del.

Comatule de la Méditerranée. (Comatula Mediterranea.)

- 1. 2. 3. La Comatule en diverses positions, au double de la grandeur nat.
- 4. Le Disque ventral plus grossi montrant la bouche au milieu et l'Orifice anal en b. - 5. Une des Pinnules des bras.

ECHINODERMES.



Fourrier sc.

ACALEPHES. { 1. *Pelagia noctiluca*. (*Pelagia noctiluca*, Peron) — 2. *Berenice rosea*.
 (*Berenice rosea*, Esch) — 3. *Beroë de Forskahl*. (*Beroë* Forskahlie, Edw.)
 4. *Cladonème rayonné*. (*Cladonema radiatum*, Duj.)



POLYPES BRYOZOAIRES. 1. *Flustra foliacee*. (*Flustra foliacea*, L.) 1^b Portion de la même grossie et montrant quelques polypes épanouis.

POLYPES ALCYONIENS. 2. *Corail rouge*. (*Corallium rubrum*, Lamk.) 2^b Portion du même grossie.
3. *Cornulaire elegante*. (*Cornularia elegans*, N.) 3^b La même grossie.

POLYPES HYDRAIRES. 4. *Sertulaire naine*. (*Sertularia pumila*, L.) 4^b Portion de la même grossie.



POLYPES ILCYOMIEAS. 1. *Véretille cynomorice.* (Vértillum cynomorium, Lamk.)

POLYPES ZOANTHAIRES. 2. *Actinie anguleuse.* (Actinia effleta, Linn.; Cribrina effleta, Ehrenb.)

2' La même dans l'état de contraction.



Oudart, pinx.

Viret, sc.

CHAMPIGNONS

1 à 5. *Bolet comestible.* (*Boletus edulis*, Bull.) grand: mayenne.



Oudart, pinx

Visto, sc.

CHAMPIGNONS

1 à 5. *Bolet groupi*. (*Boletus circinans*, Pers.) de grand. nat.

Folliau imp.



Riocaux, pins

Annedouche, se.

FOUGÈRES. *Trichopteris elevi*. (*Trichopteris excelsa*, Presl.) 1/30 de gr. nat.


Folliou, imp.



Maubert pinx.

M. Noiret del.

AROIDÉES. *Caladium à feuilles bicolores.* (*Caladium bicolor.*)



Maudsl. pinx

Inredouche. sc

LILIACÉES. *Aloë à cornes de Bétier.* (*Aloe fruticosa*, LK) 1/10 de grand. nat.



Maudslayi

Boissier sc.

LILIACÉES. *Gulpe de Gesner* (Tulipa Gesneriana, L.)

Lamouroux imp.



Maubert pinx.

Rollar d. sc.

ASPARAGIÉES: *Dragonier de Brésil.* (*Dracena brasiliensis* Desf.) 7/10 de gr. nat.

Rolliau imp.




Mabert pinx.

Fournier sc.

BROMÉLIACÉES. *Echinops discolor*. (*Echinops discolor*, Ad. Brong.)

1/2 de grandeur naturelle.



Andrieux pinx.

Folliau sculp.

Pourquet sculp.




Mauvent pinx.

1/3 de gr. nat.

M. de Poiret del.

MUSACÉES. *Strelitzia de la Reine.* (*Strelitzia Reginae, Ait.*)

Rolliau imp.





CANNACÉES. *Balisier graciosa*. (*Canna speciosa*, Rost.)




Maubert pinx.

Vellard sc.

AMOMÉES. *Alpinie à fleurs pendantes.* (*Alpinia nutans*. Rose) 2/3 de gr. nat.



ORCHIDÉES. *Lelia suavis* Catloya (Lelia Cattleioides. J. Rich.) 1/2 de gr. nat.




7.



6.



2.



9.




1.




5



4.



11.



8.



10.



15.



12.

Mouret pin.

Fournier sc.



Savignol's pens.

Boissier sc.

EUPHORBACEÆS. *Euphorbia brillante.* (*Euphorbia splendens*, Dej.)




Mandré péris.

Kornig sc.

BÉGONIACÉES. *Begonia incarnata*. (*Begonia incarnata*, Otto et Link.)

Grandeur naturelle.





ARISTOLOCHIÉES. *Aristolochia siphon*. (Aristolochia Siphon, Willd.)

Folia imp.



1.



2.



3.



9.



4.



10.



8.



5.



6.





7.

Herbert pine.

Bourcier sc.

CHÉNOPODIÉES. *Baselle rouge.* (*Basella rubra*, L.)

Lamour eur. imp.



Maubert pinx.

P. D. anal. fecit.


Fournier sc.

CARYOPHYLLÉES. *Clillet barbatus*. (*Dianthus barbatus*, Linn.)

Rolland imp.





CARYOPHYLLÉES. *Billet des fleuristes.* (*Dianthus caryophyllus*, Linn.)



100 pins

Arnedouche 35

ANONACEES. *Annona à trois lobes* (*Asimina triloba*, *Mun.*)







Maubert pinx.

Fournier sc.

Fam. des LINÉES

Lin glandulosum. (Linum glandulosum, Moench.)



Maubert pine.

Pourrier oc.

Fam. des MALVACÉES. *Colennier à feuilles de vigne.* (*Gossypium vitifolium*, Lam.)



BUTYRACÉES. *Astragalus Wallichii* (Astragalus Wallichii, Lindl.)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8.

9.


10.

Scamblé pins.

Pourrier sc.



ACÉRINÉES. Erable à feuilles d'obier. (*Acer opulifolium*, Vill.)



Muhlenb. pons.

P. D. anal. ficut.

Fournier sc.

AURANTIACÉES. *Cranger Limonium*. (*Citrus Limonium*, Risso.)

Rollau imp.



Macleod pins.

Fournier sc.

LÉGUMINEUSES-PAPILIONACÉES. *Indigofera tinctoria* (Indigofera procumbens, Lin.)

Lemoineux imp.



Audouin pin.

P. D. anal. frot.

Fournier sc.

POMACÉES. *Cydonia japonica* (H. K.)

Lamourca imp.




Maubert pinx.

Fournier sc.

ROSACÉES.


Rose à cent feuilles. (Rosa centifolia, L.)



Meubert pinx.


Fournier del.

LYTHRARIÉES. *Cuphea verticillata*. (*Cuphea miniata*,)



Humbert pinx.

Pournier sc.



Moulier grav.

Fouquier sc.

PASSIFLORÉES. *Passiflora alata*. (*Passiflora alata*, Ait.)

Lamoureux imp.




Maudslowi pursh.

Fournier sc.

RIBESLACÉES. *Groenlandia dor.* (*Ribes aureum*, Pursh.)

Lamarsson imp.



Mascheron pinx.

Arnedouche sc.

CACTÉES. Mammillaire à dents d'Éléphant. (Mammillaria elephantidens, Lam.) 1/2 de gr. nat.




Stuebel pass.

Bourcier sc.

OMBELLIFÈRES. *Didiscus bleu.* (*Didiscus cœruleus*, Hook.)

Pollon imp.



6.



10.



7.






8.

Herbert. par.

Fournier. sc.

RHAMNÉES. *Zizyphus cultivé.* (*Zizyphus vulgaris*, Lam.)




Muhlb. pins.

Pournet sc.

ERICACÉES. *Bruyère ardente*. (*Erica ardens*, Andr.)

Lamourca inf.



Del. et pinx.

Fournier sc.

ERICAËES-RHODODENDRÉES. 1. *Rhododendron en arbre.* (*Rhododendron arboreum*, Smith.)

1/3 de grandeur naturelle.



2.

8.

1.

9.

5.

4.

6.

7.

3.

Meibomius pinx.





Bourcier sc.

PRIMULACÉES. *Gyroselle de Virginie.* (Dodecatheon Meadia, Lin.)

Lamouraux imp.



PLUMBAGINÉES. *Dentelaire du Cap.* (*Plumbago capensis*, Thunb.)




Meubert pinx.

Fournier sc.

LABIÉES. *Sauge à fleurs larges.* (*Salvia patens*, Benth.)

Lamourous imp.



Membre pur.

P. Duchartre anal. foët.

Fourrière 36.

ACANTHACÉES *Strobilanthes de Sabine.* (*Strobilanthes sabiniana*, Bera.)






Lamourous imp.



Maubert pinx.

Kornier sc.

GESNERIACÉES. *Gloxinia caulescens*. (*Gloxinia caulescens*, Lindl.)



Masbert pinx.

Poumier sc.

SCROPIULARIÉES. *Paulownia impérial*. (*Paulownia imperialis*, Sieb. et Zucc.)

Lamouraux imp.



Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

CONVOLVULACÉES. *Liseron des jardins.* (*Ipomoea hirsuta*, Choix)




Maubert pins.



Fournier sc.

ASCLEPIADÉES. *Stapelia parviflora*. (*Stapelia variegata*, Lin.)



Manettia pur.

Manettia bicolor.

RUBIACÉES. *Manettia bicolor.* (*Manettia bicolor.*)



GOODENIACÉES. *Peschennaultia stigmata*. (*Leschenaultia formosa*, R. Brown.)



Maudert pinx.

Fournier sc.

COMPOSÉES. *Dahlia*.

TABLES MÉTHODIQUES

DES PLANCHES

DU DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE.

ZOOLOGIE.

ARTICULÉS

(SUITE).

Classe des MYRIAPODES.

La classification suivie dans cette explication des figures de Myriapodes est celle de
MM. Walckenaër et P. Gervais.

ORDRE DES DIPLOPODES.

Tribu des GLOMÉRIDES.

N^{os} d'ordre
des
planches (1).

Pl. 1. Fig. 1. GLOMERIS MARGINÉ (*Glomeris marginata*, Oliv.). De grandeur naturelle.

1. a. La tête grossie, vue de profil.

(1) Les numéros d'ordre que portent les planches dans l'Atlas, et qui figurent ici entre deux parenthèses, doivent être considérés comme non avenus. Les nouveaux numéros placés en marge de ces colonnes indiquent l'ordre suivant lequel les planches doivent être classées par le relieur. — Voyez, à la fin de l'explication des planches du 1^{er} tome de l'Atlas, les *Tables de correspondance* entre les nouveaux numéros d'ordre et ceux qui sont gravés sur les planches.

Planches,

Tribu des **POLYDESMIDES.**

Pl. 1. Fig. 3. **POLYDÈME MEXICAIN** (*Polydesmus mexicanus*, Lucas). De grandeur naturelle.

3. a. La tête vue de face.

Tribu des **IULIDES.**

Pl. 1. Fig. 2. **IULE LUCIFUGE** (*Iulus lucifugus*, Gerv.). Grossi.

2. a. La grosseur naturelle. — 2. b. La tête vue de profil pour montrer la disposition des ocelles.

ORDRE DES CHILOPODES.

Tribu des **SCOLOPENDRIDES.**

Pl. 1. Fig. 4. **SCOLOPENDRE MORDANTE** (*Scolopendra morsitans*, Linné). De grandeur naturelle.

4. a. La tête vue de profil pour montrer la disposition des ocelles.

Classe des ARACHNIDES.

La classification suivie dans cette table méthodique des planches est celle de M. Walkenaër.

ORDRE DES ARANÉIDES.

Tribu des **THÉRAPILOSES.**

1 (Pl. 1). Fig. 1. **MYGALE DE QUOY** (*Mygale Quoyi*, Walck.). Femelle de grandeur naturelle.

1. a. Les mâchoires, les mandibules et les palpes de la **MYGALE CALPÉIENNE** (*Mygale calpeiana*, Walck.). — b. Le céphalothorax de la même, vu de face pour montrer la disposition des yeux.

2 (Pl. 2). Fig. 1. **MYGALE AVICULAIRE** (*Mygale avicularia*, Degeer). Mâle de grandeur naturelle.

Fig. 3. Extrémité d'un palpe montrant l'organe mâle.

Fig. 4. Ongle d'une patte vu de profil.

Fig. 2. Nid de la **MYGALE MAÇONNE** (*Mygale cæmentaria*, Walck.).

Tribu des **ARAIGNÉES.**

(Pl. 1). Fig. 2. **SCYTODE THORACIQUE** (*Scytodes thoracica*, Latr.). Femelle grossie.

2. a. La grandeur naturelle. — 2. b. Les mâchoires, les mandibules et les palpes. — 2. c. Le céphalothorax vu de face pour montrer la disposition des yeux.

ORDRE DES SCORPIONIDES.

Famille des **Scorpions.**

3 (Pl. 3). Fig. 1. SCORPION AFRICAÏN (*Scorpio (Buthus) afer*, Lin.). De grandeur naturelle.

a. La disposition des yeux. — *b.* Le corps vu en dessous pour montrer la disposition des peignes et des ouvertures stigmatiformes. — *c.* Un tarse vu de profil. — *d.* L'aiguillon vu de profil. — *e.* Extrémité de l'aiguillon pour montrer les deux ouvertures qui donnent passage à la liqueur vénéneuse.

Classe des CRUSTACÉS.

La classification suivie dans cette explication des planches est celle de M. Milne Edwards.

ORDRE DES DÉCAPODES BRACHYURES.

Famille des **Cyclométopes.**

Tribu des **PORTUNIENS.**

1 (Pl. 2). LUPÉE PÉLAGIQUE (*Lupa pelagica*, Lin.).

Famille des **Ptérygures.**

Tribu des **PAGURIENS.**

2 (Pl. 4). BIRGUE LARRON, OU VOLEUR (*Birgus latro*, Herbst).

Famille des **Astaciens.**

3 (Pl. 3). HOMARD COMMUN (*Homarus vulgaris*, Edw.).

Famille des **Palémoniens.**

4 (Pl. 1). PALÉMON ORNÉ (*Palemon ornatus*, Oliv.).

ORDRE DES STOMAPODES.

Famille des **Unicuirassés.**

Tribu des **SQUILLIENS.**

5 (Pl. 5). SQUILLE MACULÉE (*Squilla maculata*, Lamk.).

Classe des CIRRIPIÈDES (1).

Planches.

- Pl. 1. Fig. 1. ANATIFE LISSE (*Anatifa lævis*, Lamk.) — *a*. Pédicule. — *b*. Valves. — *c*. Manteau. — *f*. Cirrhes.
- Fig. 2. — *ff*. Cirrhes articulés. — *u*. Prolongement caudal ou proboscidiforme.
- Fig. 3. — *a, a, a*. Granulations blanches composant l'appareil générateur mâle. — *b*. Tronc commun ou tube excréteur où aboutissent les ramifications de l'appareil mâle. — *f, f*. Cirrhes articulés. — *u*. Prolongement caudal ou proboscidiforme.
- Fig. 4. TRITON ROUGE. — *a, a*. Ovaire. — *b, b*. Seconde membrane tapissant l'intérieur des valves. — *f*. Cirrhes articulés. — *g, g, g, g, g', g'*. la seconde membrane *b* se recourbant sur elle-même à la manière des séreuses. — *j, j*. Troisième enveloppe, renfermant le corps de l'animal.
- Fig. A. — Matières granuleuses de l'ovaire disposées en flocons.
- Fig. 5. — 2, 2,... Série de renflements ganglionnaires disposés par paires, et ensemble du système nerveux.
- Fig. B. — Les œufs.
- Fig. 6. — *b*. Valves. — *f, f*. Cirrhes articulés.
- Fig. C. — Pièces de la bouche.
- Fig. D. — Membrane presque cornée qui tapisse l'intérieur de l'œsophage et s'évase en forme de cloche dans l'estomac.
- Fig. 7. — Disposition des pieds sur chaque segment. — *f, f*. Cirrhes articulés. — *u*. Prolongement proboscidiforme.
- Fig. 8. — *d*. Estomac. — *d'*. Appendice communiquant avec la cavité somacale. — *t, t*. Intestin. — *x*. Prolongement proboscidiforme.
- Fig. 9. — *d*. Estomac. — *d'*. Appendice communiquant avec la cavité stomacale. — *d''*. Lacunes aréolaires de l'intérieur de l'estomac où s'enchâssent les dentelures du tube *t*.

VERS.

Classe des ANNÉLIDES.

- (Planche unique non numérotée). Fig. 1. EUMOLPE PEINTE (*Eumolpe picta*, Ok.).
1 *b*. Grandeur naturelle.
- Fig. 2. SYLLIS TACHETÉE (*Syllis maculata*, Ed.).
2 *b*. Grandeur naturelle.

(1) Voyez la note qui accompagne l'article CIRRIPIÈDES.

Planches

- Fig. 3. SERPULE CONTOURNÉE (*Serpula contortuplicata*, Lamk.).
Fig. 4. SPIROBÈ NAUTILOÏDE (*Spirorbis nautiloides*, L.).
4 b. Portion de Fucus chargée de Spirorbès de grandeur naturelle.
Fig. 5. CLEPSINE SEXOCULÉE (*Clepsine sexoculata*, Sav.).

Classe des TURBELLARIÉS.

- Fig. 6. ÉOLIDICÈRE DE BROCCHI (*Eolidiceros Brocchii*, Riss.).
6 b. Grandeur naturelle.

Classe des HELMINTHES.

- Fig. 7. DISTOME LANCÉOLÉ (*Distomum lanceolatum*, Melhis).
7 b. Grandeur naturelle.
Fig. 8. POLYSTOME DES GRENOUILLES (*Polystomum integerrimum*, Rud.).
8 b. Grandeur naturelle.

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES.

CLASSE DES CEPHALOPODES.

- 1 (Pl. 1). Fig. 1. HISTIOTEUTHIS DE BONELLI (*Histioteuthis Bonelliana*, A.d'Orb.).
1. a et b. Mandibules ou armure de la bouche.
Fig. 2. POULPE COMMUN (*Octopus vulgaris*, Lamk.).

CLASSE DES GASTÉROPODES.

La classification suivie est celle de M. Deshayes.

Ordre des HERNIAPHRODITES.

Sous-ordre des Cirrhubranches.

Famille des DENTALES.

- 2 (Pl. 13). Fig. 7. DENTALE ÉLÉPHANTINE (*Dentalium elephantinum*, Martini).

Planches.

Sous-ordre des **Cyclobranches.**

Famille des **POLYPLAXIPHORES.**

Fig. 8. OSCABRION ÉCAILLEUX (*Chiton squamosus*, Lin.).

Famille des **PATELLES.**

Fig. 1, 2. PATELLE COMMUNE (*Patella vulgata*, Lin.).

Sous-ordre des **Scutibranches.**

Famille des **RIMULAIRES.**

Fig. 3, 4. FISSURELLE EN BATEAU (*Fissurella nimbosa*, Lamk.).

Famille des **CALYPTRACIENS.**

Fig. 6. CABOCHON BONNET HONGROIS (*Pileopsis hungarica*, Lamk.).

Fig. 5. CALYPTRÉE SCABRE (*Calyptrea equestris*, Lamk.).

Sous-ordre des **Aristérobanches.**

Famille des **MACROSTOMES.**

3 (Pl. 11). Fig. 6, 7. HALIOTIDE RAYONNÉE (*Haliotis radiata*, Desh.).

Sous-ordre des **Tubulibranches.**

Famille des **TUBISPIRÉS.**

Fig. 1. VERMET D'ADANSON (*Vermetus lumbricalis*, Lamk.).

Fig. 2. MAGILE ANTIQUE (*Magilus antiquus*, Lamk.).

Sous-ordre des **Asiphonobranches.**

Famille des **TURBINACÉS.**

Fig. 5. TURBO RUBANÉ (*Turbo petholatus*, Lin.).

Fig. 3, 4. SCALAIRE COURONNÉE (*Scalaria coronata*, Lamk.).

Famille des **PÉRISTOMIENS.**

4 (Pl. 12). Fig. 3, 4. PALUDINE DU BENGALÉ (*Paludina bengalensis*, Lamk.).

Famille des **MÉLANIENS.**

Fig. 1, 2. MÉLANIE TRONQUÉE (*Melania atra*, Desh.).

Famille des **PLICACÉS.**

Fig. 7, 8. PYRAMIDELLE TACHETÉE (*Pyramidella maculosa*, Lamk.).

Fig. 5, 6. TORNATELLE BROCARD (*Tornatella flammea*, Lamk.).

Famille des **JANTHINES.**

Fig. 9, 10. JANTHINE COMMUNE (*Janthina communis*, Lamk.).

Famille des **NÉRITACÉS.**

5 Pl. 10). Fig. 4, 5. NATICE FLAMMULÉE (*Natica canrena*, Lamk.).

Famille des **SIGARETS.**

Fig. 2, 3. SIGARET DÉPRIMÉ (*Sigaretus haliotoideus*, Lamk.).

Ordre des MONOÏQUES.

Sous - ordre des **Tectibranches.**

Famille des **ACÈRES.**

Fig. 6, 7, 8. BULLE BANDEROLE (*Bulla Aplustre*, Lin.).

Famille des **APLYSIENS.**

Fig. 1. APLYSIE PONCTUÉE (*Aplysia punctata*, Cuv.).

Sous-ordre des **Pleurobranches.**

Famille des **OMBRELLES.**

Fig. 9. OMBRELLE DE LA MÉDITERRANÉE (*Umbrella mediterranea*, Lamk.).

Sous ordre des **Pulmonobranches.**

Famille des **COLIMACÉS.**

- 6 (Pl. 19). Fig. 1, 2. HÉLICE TROCHIFORME (*Helix epistylum*, Mull.).
Fig. 3, 4. HÉLICE MACROSTOME (*Helix vittata*, Mull.).
Fig. 5, 6. HÉLICE SINUÉE (*Helix sinuata*, Mull.).
Fig. 7, 8. HÉLICE MULTICOLORE (*Helix polychroa*, Swains.).
Fig. 9, 10. HÉLICE PYRAMIDELLE (*Helix Pyramidella*, Wagn.).
Fig. 11, 12, 13. HÉLICE DE LISTER (*Helix Listeriana*, Gray).
Fig. 14, 15, 16. HÉLICE POLYGYRE (*Helix polygyrata*, Born.).
- 7 (Pl. 20). Fig. 1, 2. BULIME DE MENDOR (*Bulimus Mendorensis*, Brod.).
Fig. 3, 4. BULIME BURINÉ (*Bulimus signatus*, Wagn.).
Fig. 5, 6. BULIME PUDIQUE (*Bulimus pudicus*, Mull.).
Fig. 7, 8. BULIME PANTAGRUEL (*Bulimus Pantagruelinus*).
Fig. 9, 10. BULIME RONGEUR (*Bulimus exesus*, Spix).
Fig. 11, 12. MAILLOT CHRYSAÏDE (*Pupa Chrysalis*, Fér.).

Ordre des DIOIQUES.

Sous-ordre des Pectinibranches.

Famille des CANALIFÈRES.

- 8 (Pl. 21). Fig. 4. CANCELLAIRE OBTUSE (*Cancellaria obtusa*, Desh.).
Fig. 3. TURBINELLE POIRE (*Turbinella pyrum*, Lamk.).
Fig. 5. FUSEAU LONGIROSTRE (*Fusus longirostris*, Desh.).
Fig. 1. NÉRINÉE TUBERCULEUSE (*Nerinæa nodosa*, Def.).
Fig. 2. CÉRITHE CHENILLE (*Cerithium Aluco*, Brug.).
Fig. 6. ROCHER PALME-DE-ROSIER (*Murex Palma-rosæ*, Lamk.).

Famille des AILÉS.

- 9 (Pl. 22). Fig. 5. ROSTELLAIRE BEC ARQUÉ (*Rostellaria curvirostris*, Lamk.).
Fig. 1. STROMBE VARIABLE (*Strombus variabilis*, Swains.).

Famille des POURPRÉS.

- Fig. 6. CASQUE ZÈBRE (*Cassis undata*, Martini).
Fig. 3. RICINULE DIGITÉE (*Ricinula digitata*, Lamk.).
Fig. 7. POURPRE PERSIQUE (*Purpura persica*, Lamk.).
Fig. 4. LICORNE LÈVRE ÉPAISSE (*Monoceros crassilabrum*, Lamk.).
Fig. 2. CHONCHOLÉPAS DU PÉROU (*Choncholepas peruvianus*, Lamk.).

Famille des BUCCINÉS.

- 10 (Pl. 23). Fig. 7. HARPE VENTRUE (*Harpa ventricosa*, Lamk.).
Fig. 1. COLOMBELLE GRANDE (*Colombella major*, Sow.).
Fig. 2, 3. BUCCIN CASQUILLON (*Buccinum arcularia*, Lin.).
Fig. 8. BUCCIN MÉLANOSTOME (*Buccinum melanostoma*, Sow.).
Fig. 5. VIS ZÈBRÉE (*Terebra strigata*, Sow.).
Fig. 6. CÔNE IMPÉRIAL (*Conus imperialis*, Lin.).

Famille des COLUMELLAIRES.

- Fig. 4. VOLUTE ONDULÉE (*Voluta undulata*, Lamk.).
11 (Pl. 24). Fig. 5. MÎTRE SCABRIUSCULE (*Mitra scabriuscula*, Lin.).

Famille des ENROULÉS.

- Fig. 2, 3. VOLVAIRE HYALINE (*Volvaria pallida*, Lamk.).
Fig. 6. TARIÈRE SUBULÉE (*Terebellum subulatum*, Lamk.).
Fig. 1. ANCILLAIRE BORDÉE (*Ancillaria marginata*, Lamk.).
Fig. 9. OLIVE DU PÉROU (*Oliva peruviana*, Lamk.).
Fig. 4. MARGINELLE D'ADANSON (*Marginella Adansoni*, Kiener).
Fig. 7, 8. OVULE INTERMÉDIAIRE (*Ovula intermedia*, Sow.).
Fig. 10. PORCELAINES BOUFFONNES (*Cypræa scurra*, Chemn.).

CLASSE DES ACÉPHALÉS.

La classification suivie est celle de M. Deshayes.

Sous-classe des Dimyaires.

1^{er} ORDRE. — Famille des TUBICOLÉES.

Planches.

12 (Pl. 2). Fig. 3. ARROSOIR DE JAVA (*Aspergillum javanum*, Lamk.).

Famille des PHOLADAIRES.

Fig. 5, *a* et *b*. TARET COMMUN (*Teredo navalis*, Lin.).

Fig. 4, *a* et *b*. PHOLADE DACTYLÉ (*Pholas dactylus*, Lin.).

Famille des SOLÉNACÉES.

Fig. 4, *a* et *b*. GLYCYMÈRE SILIQUE (*Glycymeris siliqua*, Lamk.).

Fig. 2, *a* et *b*. SOLEN SILIQUE (*Solen siliqua*, Lin.).

Famille des MYAIRES.

13 (Pl. 3). Fig. 3, *a* et *b*. MYE TRONQUÉE (*Mya truncata*, Lin.).

Famille des OSTÉODESMES.

Fig. 5, *a*, *b*, *c*. ANATINE TRONQUÉE (*Anatina truncata*, Lamk.).

Famille des MACTRACÉES.

Fig. 1, *a* et *b*. GNATHODON CUNÉIFORME (*Gnathodoncuncatum*, Gray).

Fig. 4, *a* et *b*. MACTRE MOUCHETÉE (*Mactra maculosa*, Lamk.).

Fig. 2, *a* et *b*. CRASSATELLE ROSTRÉE (*Crassatella rostrata*, Lamk.).

Famille des CYCLADÉES.

14 (Pl. 4). Fig. 7, 8, 9. CYCLADE DES RIVIÈRES (*Cyclas rivicola*, Lamk.).

Fig. 3, 4. CYRÈNE CORDIFORME (*Cyrena cordiformis*, Desh.).

Fig. 4, 2. GALATHÉE A RAYONS (*Galathea radiata*, Lamk.).

Famille des CONQUES.

Fig. 5, 6. ASTARTÉ D'ISLANDE (*Astarte islandica*, Desh.).

Famille des CARDIACÉES.

15 (Pl. 5). Fig. 1, 2. BUCARDE GÉANTE (*Cardium magnum*, Lin.).

Famille des TRIDACNÉES.

Fig. 5, 6. TRIDACNE FAÏTIÈRE (*Tridacna squamosa*, Lamk.).

Famille des CAMACÉES.

Fig. 7, 8. CAME CORNE DE DAIM (*Chama damæcornis*, Lamk.).

2^e ORDRE. — Famille des ÉTHÉRIES.

Planches.

Fig. 3, 4. ÉTHÉRIE PLOMBÉE (*Etheria plumbea*, Fér.).

Sous-classe des **Monomyaires**

1^{er} ORDRE. — Famille des PECTINIDES.

16 (Pl. 8). Fig. 1, 2. LIME ÉCAILLEUSE (*Lima squamosa*, Lam.).

Fig. 6, 7. PECTEN TIGRÉ (*Pecten tigris*, Lamk.).

Fig. 3, 4. SPONDYLE SAFRANÉ (*Spondylus crocatus*, Desh.).

2^e ORDRE. — Famille des OSTRACÉES.

1 (Pl. 9). Fig. 8, 9. ANOMIE PELURE D'OIGNON (*Anomia ephippium*, Lin.).

(Pl. 8). Fig. 5. HÛITRE FEUILLE (*Ostrea folium*, Lamk.)

Sous classe des **Brachiopodes.**

Famille des PRODUCTES.

(Pl. 9). Fig. 10. PRODUCE TREILLISSÉ (*Productus antiquatus*, Sow.).

Famille des TÉRÉBRATULES.

Fig. 5, 6. TÉRÉBRATULE LYRE (*Terebratula Lyra*, Lamk.).

Fig. 7. TÉRÉBRATULE LENTICULAIRE (*Terebratula lenticularis*, Desh.).

Fig. 11, 12. TÉRÉBRATULE DE SAY (*Terebratula Sayi*, Morton).

Famille des THIÉCIDÉES.

Fig. 1, 2. THÉCIDÉE RAYONNANTE (*Thecidea radians*, Def.).

Famille des CRANIES.

Fig. 3, 4. CALCÉOLE SANDALINE (*Calceola sandalina*, Lamk.)

EMBRANCHEMENT DES ZOOPHYTES.

CLASSE DES ÉCHINODERMES.

Ordre des Échinides.

1 (Pl. 1). Fig. 1 et 1^a. CIDARITE IMPÉRIALE (*Cidaris imperialis*, Lamk.).

Fig. 2. OURSIN ARTICHAUT (*Echinus atratus*, Lin.).

Fig. 3. OURSIN GLOBIFORME (*Echinus globiformis*, Lamk.).

Fig. 4, 4^a et 4^b. SCUTELLE RADIÉE (*Scutella radiata*, Blainv.).

Fig. 5 SCUTELLE A CINQ TROUS (*Scutella quinquefora*, Lamk.).

Fig. 6, a-f. Piquants de diverses espèces d'Oursins.

Ordre des **Stellérides.**

Planches.

2 (Pl. 3). COMATULE DE LA MÉDITERRANÉE (*Comatula mediterranea*).

CLASSE DES ACALÈPHES.

3 (Pl. 4). Fig. 1. PÉLAGIE NOCTILUQUE (*Pelagia noctiluca*, Péron).

Fig. 2. BÉRÉNICE ROSE (*Berenice rosea*, Esch.).

Fig. 3. BÉROÉ DE FORSKAHL (*Beroe Forskahlü*, Edw.).

Fig. 4. CLADONÈME RAYONNÉ (*Cladonema radiatum*, Duj.).

CLASSE DES POLYPES.

BRYOZOAIRES.

4 (Pl. 5). Fig. 1 et 1^b. FLUSTRE FOLIACÉE (*Flustra foliacea*, Lin.).

ZOANTHAIRES.

5 (Pl. 2). Fig. 2 et 2^a. ACTINIE ANGULEUSE (*Actinia effata*, Lin.).

ALCYONIENS.

(Pl. 2). Fig. 1. VÉRÉTILLE CYNOMOIRE (*Veretillum cynomorium*, Lamk.).

(Pl. 5). Fig. 2 et 2^b. CORAIL ROUGE (*Corallium rubrum*, Lamk.).

Fig. 3 et 3^b. CORNULAIRE ÉLÉGANTE (*Cornularia elegans*),^{ss}

HYDRAIRES.

Fig. 4 et 4^b. SERTULAIRE NAINÉ (*Sertularia pumila*, Lin.).

BOTANIQUE.

L'ordre qui sera suivi pour l'explication qui va suivre est celui adopté par M. A. de Jussieu dans son article TAXONOMIE, inséré dans ce Dictionnaire.

Plantes ACOTYLÉDONÉES ou CRYPTOGAMES.

DIVISION DES CELLULAIRES-ANGIOSPORÉES.

Famille des CHAMPIGNONS.

Planches.

1 (Pl. 7). BOLET COMESTIBLE (*Boletus edulis*, Bull.).

Fig. 1. Le champignon entier.

Fig. 2. Coupe longitudinale du même.

Fig. 3, 4, 5. Détails de la fructification très grossis et isolés : — 3. Portion de tube avec des cystides et des basides. — 4. Cystide grossie. — 5. Spores grossies.

2 (Pl. 8). BOLET GROUPÉ (*Boletus circinans*, Pers.).

Fig. 1. Le champignon entier, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Le même, jeune, avec des gouttes lactescentes.

Fig. 3. Coupe verticale.

Fig. 4, 5, 6. Détails de la fructification isolés et grossis : — 4. Coupe d'une cellule chargée de basides. — 5. Baside et spores grossis. — 6. Spores très grossies.

DIVISION DES VASCULAIRES.

Famille des FOUGÈRES-POLYPODIACÉES.

3 (Pl. 16). TRICHOPTERIS ÉLEVÉ (*Trichopteris excelsa*, Presl.).

Fig. 1. Une pinnule entière, vue par la face inférieure.

Fig. 2. Base de la même grossie, pour mieux montrer la fructification ou les sores (*a*), dont deux ont été enlevés (*b*) pour montrer leur situation sur une nervure.

Fig. 3. Un sore grossi.

Fig. 4. Un sporange isolé, très grossi : (*a*) son pédicule ; (*b*) son anneau.

Plantes MONOCOTYLÉDONÉES.

DIVISION DES PÉRISPERMÉES.

Section des Spadiciiflores.

Famille des ARACÉES ou AROÏDÉES.

Planches.

- 1 (Pl. 2). CALADION A FEUILLES BICOLORES (*Caladium bicolor*).
Fig. 1. Spadice isolé, entier.
Fig. 2, 3. Pollen.
Fig. 4. Fleur mâle, montrant le connectif épais et tronqué, autour duquel s'attachent les anthères, qui sont uni-loculaires.
Fig. 5. Pistil coupé longitudinalement pour montrer les deux loges.
Fig. 6. Pistil entier.
Fig. 7. Un ovule isolé, très grossi.

Section des Homoblastées.

SUPEROVARIÉES.

Famille des LILIACÉES.

- 2 (Pl. 13). ALOËS A CORNES DE BÉLIER (*Aloe fruticosa*, Lamk.).
Fig. 1. Fleur entière.
Fig. 2. Fleur coupée longitudinalement pour montrer les deux rangées d'ovules.
Fig. 3. Extrémité du style et stigmate très grossis.
Fig. 4. Ovaire dont on a ouvert longitudinalement une loge, pour montrer les deux séries d'ovules.
- 3 (Pl. 3). TULIPE DE GESNER (*Tulipa gesneriana*, Lin.). — Diverses variétés cultivées.
- 4 (Pl. 12). DRAGONNIER DU BRÉSIL (*Dracæna brasiliensis*, Desf.).
Fig. 1. Un rameau de l'inflorescence isolé.
Fig. 2. Fleur entière isolée.
Fig. 3. La même, coupée longitudinalement pour montrer l'insertion des étamines sur le périanthe.
Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.
Fig. 5. Pistil entier, dont l'ovaire et partie du style ont été coupés longitudinalement.

INFEROVARIÉES.

Famille des BROMÉLIACÉES.

- 5 (Pl. 4). ÆCHMÉE DISCOLORE (*Æchmea discolor*, Ad. Brong.).
Fig. 1, 2. Fleur non ouverte, vue de deux côtés différents.
Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur.

Planches.

- Fig. 4. Portion du péricarpe, vue par dedans, montrant deux étamines et deux écailles qui alternent avec celles-ci.
Fig. 5. Une étamine de profil, et, fig. 6, de face.
Fig. 7. La portion de la fleur représentée par la figure 4, vue de profil.
Fig. 8. Style et stigmates très grossis.
Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire, grossie.
Fig. 10. Un ovule isolé, très grossi, adulte.
Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des MUSACÉES.

6 (Pl. 6). BANANIER DE LA CHINE (*Musa chinensis*, Sweet).

- Fig. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, vue de côté.
Fig. 2. La même, dont on a brisé le péricarpe à sa base de manière à le relever et à montrer toutes les parties de la fleur.
Fig. 3. Organes sexuels dans leur ensemble.
Fig. 4. Une étamine isolée, vue par son côté interne.
Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère grossie.
Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire à ovules avortés.
Fig. 7. Diagramme de la fleur.

7 (Pl. 16). STRELITZIE DE LA REINE (*Strelitzia reginae*, Ait.).

- Fig. A. Inflorescence entière.
Fig. B. Feuille.
Fig. C. Port de la plante.
Fig. D. Fleur dans laquelle on a enlevé la rangée externe du péricarpe et fendu longitudinalement la pièce formée par la soudure des deux pièces latérales internes, dans le but de mettre à nu les cinq étamines, le style et les stigmates.
Fig. E. Rangée interne du péricarpe conservée intacte, et embrassant les organes sexuels.
Fig. G. La troisième et petite pièce du péricarpe interne, vue par dedans et par dehors.

Famille des CANNACÉES.

8 (Pl. 5). BALISIER GRACIEUX (*Canna speciosa*, Rosc.).

- Fig. 1. Port de la plante.
Fig. 2. L'étamine et le style d'une fleur adulte.
Fig. 3. Étamine jeune, vue par sa face interne; on a enlevé le style.
Fig. 4. La même, vue par son dos.
Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère.
Fig. 6. Coupe transversale du style (extrémité épaisse) et du filet pétaloïde de l'étamine.
Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie.
Fig. 8. Coupe transversale du même, plus grossie.
Fig. 9. Un ovule très grossi.

Famille des AMOMÉES ou ZINGIBÉRACÉES.

9 (Pl. 17). ALPINIE A FLEURS PENDANTES (*Alpinia nutans*, Rosc.).

- Fig. 1. Bouton encore fermé.

Planches :

- Fig. 2. Fleur entière épanouie.
Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur montrant l'anthère, dans le sillon de laquelle s'applique le style.
Fig. 4. L'anthère grossie, vue de face.
Fig. 5. Stigmate.

Section des **Aschidoblastées.**

Famille des **ORCHIDÉES.**

- 10 (Pl. 19). **LELIA FAUX CATTLEYA** (*Lelia Cattleioides*, A. Rich.).
Fig. A. La colonne entière.
Fig. B. Sa partie supérieure grossie et vue de face.
Fig. C. Masses polliniques.

Plantes **DICOTYLÉDONÉES.**

DIVISION DES GYMNOSPERMES.

Famille des **ABIÉTINÉES**

- 1 (Pl. 29). **PIN MARITIME** (*Pinus maritima*, Lamk.).
Fig. 1. Inflorescence mâle très jeune.
Fig. 2. Inflorescence mâle adulte.
Fig. 3. Fleur mâle isolée, vue par dessous, montrant les deux fentes longitudinales qui livrent passage au pollen.
Fig. 4. La même, vue de côté.
Fig. 5. La même, vue par dessus.
Fig. 6. La même, coupée transversalement.
Fig. 7. Un grain de pollen très grossi, vu un peu de côté.
Fig. 8. Le même, vu par dessus.
Fig. 9. Deux fruits en place, appliqués contre l'écaille du cône, de grandeur naturelle.
Fig. 10. Fruit entier isolé.
Fig. 11. Fruit coupé longitudinalement, de manière à montrer l'embryon en place.
Fig. 12. Embryon entier isolé. — Le graveur a représenté à tort son extrémité radiculaire nettement terminée.
Fig. 13. Coupe transversale des cotylédons montrant la division nette en deux groupes opposés des lobes, que beaucoup de botanistes ont regardés jusqu'à ce jour comme autant de cotylédons distincts. Cette disposition prouve qu'il n'y a là que deux cotylédons profondément partagés en quatre lobes chacun.

DIVISION DES ANGIOSPERMES-DICLINES.

Section des Plousianthées

Famille des EUPHORBIACÉES.

Planches.

- 2 (Pl. 15). EUPHORBE BRILLANTE (*Euphorbia splendens*, Boj.).
Fig. 1. Branche fleurie, de grandeur naturelle.
Fig. 2. Une inflorescence entière, vue de côté.
Fig. 3. La même, vue par dessus.
Fig. 4. Une fleur mâle isolée, vue de côté, avec une bractée laciniée.
Fig. 5. La même, vue par le dos et sans bractée.
Fig. 6. Coupe longitudinale d'une inflorescence montrant au centre la fleur femelle entourée de fleurs mâles, et de petites bractées laciniées entremêlées à celles-ci.
Fig. 7. Inflorescence jeune dont on a enlevé les deux grandes bractées rouges.
Fig. 8. Fleur femelle entière, très grossie.
Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire de la même.

Famille des BÉGONIACÉES.

- 3 (Pl. 25). BEGONIA INCARNAT (*Begonia incarnata*, Otto et Link).
Fig. 1. Fleur mâle, vue de côté.
Fig. 2. Pistil entier de la fleur femelle.
Fig. 3. Le même, vu par dessus.
Fig. 4. Anthère entière encore fermée.
Fig. 5. Anthère ouverte.
Fig. 6. Deux grains de pollen sous deux positions différentes, grossis de 425 diamètres.
Fig. 7. Style et stigmates.
Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire, grossie.
Fig. 9. Ovule isolé, grossi de 90 diamètres.

DIVISION DES APÉTALES.

Section des Gynandrées.

Famille des ARISTOLOCHIÉES.

- 4 (Pl. 1). ARISTOLOCHE SIPHON (*Aristolochia siphon*, Lhérit.).
Fig. 1. Diagramme de la fleur.
Fig. 2. Périanthe fermé montrant sa préfloraison.
Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur épanouie.
Fig. 4. Organes sexuels grossis : a. Anthères gynandres. — b. Stigmates. — c. Ovaire.

Planches.

- Fig. 5. Pollen.
Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire : *a.* Portion cellulaire des parois. — *b.* Faisceaux vasculaires. — *c.* Ovules unisériés.
Fig. 7. Un ovule très grossi : *a.* Raphé. — *b.* Primine. — *c.* Secondine.
Fig. 8. Fruit.
Fig. 9. Graine vue de côté : *a.* Funicule. — *b.* Caroncule formée par une dilatation du raphé.
Fig. 10. La graine, dont on a enlevé la caroncule, et accompagnée de deux lambeaux de l'endocarpe *a.*
Fig. 11. Coupe transversale de la graine.
Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine pour montrer l'embryon en place.
Fig. 13. Embryon isolé très grossi.
Fig. 14. Fragment d'une coupe transversale de la tige de l'*Aristolochia siphon*, Lhérit.
Fig. 15. Fragment d'une coupe transversale de la tige de l'*Aristolochia clematitis*, Lin.

Section des **Apétales-Cyclospémées.**

Famille des **BASELLACÉES** (démembreée des **CHÉNOPODÉES**).

Pl. 20). **BASELLE ROUGE** (*Basella rubra*, Lin.).

- Fig. 1. Un lobe du périanthe avec l'étamine opposée non ouverte.
Fig. 2. Étamine non ouverte, vue par sa face externe.
Fig. 3. Pistil entier.
Fig. 4. Coupe longitudinale de l'ovaire.
Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.
Fig. 6. L'ovule dans sa position naturelle.
Fig. 7. Fruit entier de grosseur naturelle, vu par dessus, enveloppé par le périanthe accru et devenu succulent.
Fig. 8. Coupe transversale du même.
Fig. 9. L'embryon spiral isolé, vu de côté.
Fig. 10. Le même embryon vu vers son extrémité radiculaire.

DIVISION DES POLYPÉTALES.

Section des **Polypétales-Cyclospémées.**

Famille des **CARYOPHYLLÉES.**

6 (Pl. 10). **OEILLET BARBU** (*Dianthus barbatus*, Lin.).

- Fig. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, avec ses bractées.
Fig. 2. Pétale isolé.

Planches.

- Fig. 3. Pistil entier. On a fendu longitudinalement et rejeté de côté le calice pour montrer le gynophore et la base des filets coupés.
- Fig. 4. Coupe longitudinale de l'ovaire.
- Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire adulte, dans lequel les cloisons ont cessé d'exister.
- Fig. 6. Coupe transversale d'un ovaire jeune, et dans lequel les deux cloisons existent encore.
- Fig. 7. Ovule entier, très grossi.
- Fig. 8. Capsule entière entourée par le calice et les bractées.
- Fig. 9. La même, dénudée, le calice ayant été rabattu.
- Fig. 10. Coupe longitudinale de la même.
- Fig. 11. Graine entière, vue par son dos, triplée.
- Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine, montrant l'embryon légèrement arqué.
- Fig. 13. Embryon entier isolé, vu de côté.
- Fig. 14. Embryon vu par le dos d'un cotylédon.

7 (Pl. 8). OEILLET DES FLEURISTES (*Dianthus Caryophyllus*, Lin.).

Sous-Division des POLYPÉTALES-HYPOGYNES.

Section des **Hypogynes-Axospermées.**

Famille des ANONACÉES.

- 8 (Pl. 2). ANONA A TROIS LOBES (*Asimina triloba*, Dun.).
- Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.
- Fig. 2, 3. Une anthère vue par sa face et par son dos.
- Fig. 4. La même, coupée transversalement.
- Fig. 5. Pollen.
- Fig. 6. Un des pistils entier, et vu de côté.
- Fig. 7. Le même, coupé longitudinalement.
- Fig. 8. Le même, coupé transversalement.
- Fig. 9. Un ovule.
- Fig. 10. Fruit entier.
- Fig. 11. Une baie isolée, mûre.
- Fig. 12. Graine entière.
- Fig. 13. Graine coupée longitudinalement pour montrer son embryon en place et son albumen ruminé.
- Fig. 14. Embryon isolé.

Famille des LINACÉES ou LINÉES.

- 9 (Pl. 38). LIN GLANDULEUX (*Linum glandulosum*, Moench).
- Fig. 1. Bouton et bractée.
- Fig. 2. Organes sexuels d'une fleur non ouverte.
- Fig. 3. Une étamine détachée, vue par sa face interne.

Planches.

- Fig. 4. Pistil entier.
- Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 6. Sa coupe longitudinale.
- Fig. 7. Un stigmate très grossi.
- Fig. 8. Graine vue par son dos.
- Fig. 9. Coupe longitudinale de la même, menée perpendiculairement au plan des cotylédons.
- Fig. 10. Embryon isolé.
- Fig. 11. Embryon coupé longitudinalement (ces deux figures d'après le *Linum usitatissimum*, Lin.).
- Fig. 12. Diagramme de la fleur.

Famille des MALVACÉES.

10 (Pl. 11). COTONNIER A FEUILLES DE VIGNE (*Gossypium vitifolium*, Lamk.).

- Fig. 1. Involucre entier.
- Fig. 2. Calice entier.
- Fig. 3. Fleur dans laquelle on a enlevé la partie antérieure du calice, trois pétales et la partie inférieure du tube staminal, pour montrer les relations des organes floraux.
- Fig. 4. Un pétale entier, réduit à moitié grandeur.
- Fig. 5. Une anthère grossie.
- Fig. 6. Pistil entier.
- Fig. 7. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 8. Sa coupe longitudinale.
- Fig. 9. Graine de grandeur naturelle, revêtue de ses poils qui forment le coton.
- Fig. 10. Coupe longitudinale de la graine, pour montrer ses cotylédons chiffonnés et ployés très irrégulièrement, ainsi que la couche mince d'albumen presque mucilagineux qui entoure l'embryon.
- Fig. 11. Embryon dont on a étalé et coupé transversalement les cotylédons.

Famille des BUTTNÉRIACÉES.

11 (Pl. 17). ASTRAPÉE DE WALLICH (*Astrapæa Wallichii*, Lind.). — Réduit à environ un dixième; à côté est une fleur de grandeur naturelle.

- Fig. 1. Fleur dont on a enlevé les pétales.
- Fig. 2. Une anthère grossie.
- Fig. 3. Pistil entier.
- Fig. 4. Stigmate vu par dessus.
- Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire
- Fig. 6. Coupe longitudinale du même.
- Fig. 7. Ovule.

Famille des TERNSTRÉMIACÉES.

12 (Pl. 28). CAMELLIA DU JAPON (*Camellia japonica*, Lin.).

- Fig. 1. Branche fleurie.

Planches.

- Fig. 2. Bouton.
- Fig. 3. Deux pétales et portion des étamines.
- Fig. 4. Anthère non ouverte, vue par sa face externe.
- Fig. 5. Par son côté interne, après que le filet a été enlevé.
- Fig. 6. Étamine vue de profil.
- Fig. 7. Pistil entier.
- Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 9. Fruit entier adulte.
- Fig. 10. Fruit dans lequel le péricarpe a été enlevé à moitié, les graines ayant été respectées.
- Fig. 11. Coupe longitudinale d'une graine (ces trois dernières figures d'après le *Botanical Magazine*, tab. 2784).

Famille des ACÉRINÉES.

- 43 (Pl. 24). ÉRABLE A FEUILLES D'OBIER (*Acer opulifolium*, Vill.).
- Fig. 1. Fleur entière, grossie, dont on a rabattu la corolle et le calice pour montrer le disque duquel sortent les étamines.
 - Fig. 2. Une anthère vue par sa face interne.
 - Fig. 3. Pistil entier vu par sa large face.
 - Fig. 4. Le même, vu par dessus.
 - Fig. 5. Ovaire coupé transversalement.
 - Fig. 6. Fruit.
 - Fig. 7. Graine un peu avant sa maturité, dans la loge du fruit.
 - Fig. 8. Coupe d'une graine un peu avant sa maturité, grossie deux fois.
 - Fig. 9. Embryon de la même, isolé et coupé longitudinalement.
 - Fig. 10. Embryon isolé et un peu déroulé.

Famille des AURANTIACÉES.

- 44 (Pl. 18). ORANGER LIMONIER (*Citrus limonium*, Risso.). — Réduit de moitié.
- Fig. 1. Bouton entier.
 - Fig. 2. Portion d'étamine isolée.
 - Fig. 3. Coupe transversale d'une anthère.
 - Fig. 4. Fleur dont on n'a conservé que le calice et le pistil.
 - Fig. 5. La même, dont on a enlevé la moitié du calice pour montrer le pistil entier et les marques de l'insertion des étamines.
 - Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire.
 - Fig. 7. Coupe longitudinale du même.
 - Fig. 8. Un grain de pollen à sec, grossi de 390 diamètres.
 - Fig. 9. Un autre grain dans l'eau.
 - Fig. 10. Coupe transversale d'une loge du fruit. Les grosses utricules qui renferment la pulpe ne manifestent pas nettement leur arrangement : sur les ovaires jeunes, on voit qu'elles proviennent de sortes de poils articulés qui se sont développés sur la partie externe de la loge.
 - Fig. 11. Une graine entière.
 - Fig. 12. Coupe d'une graine dans laquelle on voit deux embryons.

Sous-Division des POLYPÉTALES-PÉRIGYNES.

Section des Axospermées apérispermées.

Famille des LÉGUMINEUSES-PAPILIONACÉES.

Planches.

- 45 (Pl. 30). INDIGOTIER COUCHÉ (*Indigofera procumbens*, Lin.). — Le peintre en a représenté à tort tous les rameaux dressés.
- Fig. 1. L'étendard.
Fig. 2. Une aile.
Fig. 3, 4. Carène de profil et de face.
Fig. 5. Fleur dont on a enlevé la corolle.
Fig. 6. Androcée isolée et étalée.
Fig. 7. Pistil isolé.
Fig. 8. Légume de l'*Indigofera tinctoria*, Lin.
Fig. 9. Graine entière sèche.
Fig. 10. Graine entière ayant séjourné plusieurs heures dans l'eau.
Fig. 11. Son embryon, vu de côté.
Fig. 12. Le même, vu par la commissure des cotylédons; la radicule est déjetée vers un côté.

Famille des POMACÉES.

- 46 (Pl. 33). COGNASSIER DU JAPON (*Cydonia japonica*, Lamk.).
- Fig. 1. Bouton près de s'ouvrir.
Fig. 2. Fleur épanouie.
Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur qui vient de s'ouvrir et dans laquelle les styles sont encore courts.
Fig. 4. Fleur dont la corolle est déjà tombée et dont le calice s'est accru notablement.
Fig. 5, 6. Une anthère vue de face et par le dos.
Fig. 7. Pistil d'une fleur bien épanouie.
Fig. 8. Un stigmate grossi.
Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, assez fortement grossi.
Fig. 10. Coupe transversale du même.
Fig. 11. Un ovule isolé et très grossi.
Fig. 12. Fruit réduit de moitié.
Fig. 13. Le même, coupé longitudinalement et montrant nettement la couche externe, très épaisse, qui provient de l'accroissement du tube du calice.
Fig. 14. Une graine entière de grandeur naturelle.
Fig. 15. Coupe d'une graine non mûre un peu grossie.
Fig. 16. L'embryon de la même, isolé, vu par le dos d'un cotylédon, dont on voit la nervation.

Famille des ROSACÉES.

- 27 (Pl. 9). ROSE A CENT FEUILLES (*Rosa centifolia*, Lin.).

Famille des **LYTHRARIÉES.**

18 (Pl. 27). **CUPHÉE VERMILLONÉE** (*Cuphea miniata*).

Fig. 1. Fleur entière, vue de face.

Fig. 2. Calice de profil, pour montrer la gibbosité de sa base, à son côté supérieur.

Fig. 3. Une des anthères à filet barbu prise dans un bouton long de 4 centimètre, de profil.

Fig. 4. La même, vue de face.

Fig. 5. Série de onze étamines d'un bouton long de 5 millimètres seulement, pour montrer qu'elles sont alors toutes semblables entre elles.

Fig. 6. Série des étamines d'une fleur adulte, pour montrer les altérations et les avortements qu'elles ont subis.

Fig. 7. Pistil entier, extrêmement jeune.

Fig. 10. Coupe transversale du même, pour montrer qu'il a deux loges bien distinctes et presque égales.

Fig. 11. Coupe transversale de l'ovaire pris dans un bouton de 3 millimètres de long.

Fig. 8. Pistil entier d'un bouton avancé, mais clos.

Fig. 12. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux cloisons, fort minces, sont près de se rompre.

Fig. 9. Pistil adulte, vu de côté.

Fig. 13. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux cloisons se sont rompues : on a indiqué par un petit cercle, à côté de ces deux figures, la situation de l'axe.

Famille des **ONAGRARIÉES** ou **ÆNOTHÉRÉES.**

19 (Pl. 4). **FUCHSIA GRÊLE** (*Fuchsia gracilis*, Lindl.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2. Deux étamines avec un pétale et un lobe calicinal.

Fig. 3. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 4. Stigmate.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de deux côtés différents.

Fig. 7. Ovule.

Fig. 8 Diagramme de la fleur.

Section des **Pleurospermées.**

Famille des **PASSIFLORÉES.**

20 (Pl. 22). **PASSIFLORE AILÉE** (*Passiflora alata*, Ait.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2. Coupe longitudinale de l'ovaire et de son gynophore.

Fig. 3. Stigmate vu par dessus.

Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Ovule.

Famille des **RIBÉSIEÉS.**

- 21 (Pl. 37). GROSEILLIER DORÉ (*Ribes aureum*, Pursh.).
- Fig. 1. Fleur entière, doublée.
 - Fig. 2. Un pétale avec une étamine, vus par leur face interne.
 - Fig. 3. Etamine vue de côté.
 - Fig. 4. Coupe longitudinale de l'ovaire.
 - Fig. 5. Sa coupe transversale.
 - Fig. 6. Stigmate.
 - Fig. 7. Fruit.
 - Fig. 8. Graine grossie cinq fois.
 - Fig. 9. La même, coupée longitudinalement.
 - Fig. 10. Embryon isolé.
 - Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des **CACTÉÉS.**

- 22 (Pl. 3). MAMILLAIRE A DENTS D'ÉLÉPHANT (*Mamillaria elephantidens*, Lem.).
- Fig. a. Coupe longitudinale de la fleur.
 - Fig. b. Coupe transversale de l'ovaire.
 - Fig. c. Graine.
 - Fig. d. Germination.

Section des **Axospermées périspermées.**

Famille des **OMBELLIFÈRES.**

- 23 (Pl. 16). DIDISQUE BLEU (*Didiscus cœruleus*, Hook.).
- Fig. 1. Fleur grossie dont on a enlevé les deux pétales antérieurs.
 - Fig. 2, 3. Une anthère vue par deux côtés différents.
 - Fig. 4. Les deux styles et stigmates très grossis, pour montrer que ceux-ci sont lisses.
 - Fig. 5. Tête de fruit.
 - Fig. 6. Un fruit grossi; il n'est pas entièrement mûr.
 - Fig. 7. Coupe transversale du même.
 - Fig. 8. Graine non entièrement mûre.

Sous-Division des POLYPÉTALES-SÉMIPÉRIGYNES.

Famille des **RHAMNÉES.**

- 24 (Pl. 31). JUJUBIER CULTIVÉ (*Zizyphus vulgaris*, Lamk.).
- Fig. 1. Fleur entière grossie, vue par dessus.
 - Fig. 2. La même, coupée longitudinalement.
 - Fig. 3. Une étamine avec le pétale auquel elle est opposée.
 - Fig. 4. Anthère très grossie.
 - Fig. 5. Coupe longitudinale du pistil et du disque.

Janches.

- Fig. 6. Style et stigmates.
- Fig. 7. Fruit dans lequel on a enlevé la moitié supérieure de la chair pour mettre à nu le noyau.
- Fig. 8. Noyau entier dénudé.
- Fig. 9, 10. Graine entière vue de deux côtés différents.
- Fig. 11. Coupe transversale de la graine montrant son albumen.
- Fig. 12, 13. Embryon isolé vu de deux côtés différents.

DIVISION DES MONOPÉTALES.

Sous-Division des SÉMI-MONOPÉTALEES

Famille des ÉRICACÉES.

25 (Pl. 23). BRUYÈRE ARDENTE (*Erica ardens*, Andr.).

- Fig. 1. Fleur entière grossie.
- Fig. 2. La même, dont on a enlevé la corolle et le sépale antérieur.
- Fig. 3. Une étamine vue de profil.
- Fig. 4. Anthère vue par sa face interne.
- Fig. 5. Pistil entier.
- Fig. 6. Coupe longitudinale de l'ovaire.
- Fig. 7. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 8. Ovule.
- Fig. 9. Diagramme.

Tribu des RHODODENDRÉES ou famille des RHODORACÉES.

26 (Pl. 21). RHODODENDRON EN ARBRE (*Rhododendron arboreum*, Smith).

- Fig. 1. Pied réduit au huitième.
- Fig. 2. Fleur entière, de grandeur naturelle.
- Fig. 3, 4. Anthère vue de face et de côté.
- Fig. 5. Pistil et calice.
- Fig. 6. Une loge de l'ovaire plus fortement grossie.
- Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire.
- Fig. 8. Coupe transversale du même.
- Fig. 9. Une loge isolée, coupée transversalement et fortement grossie.

Famille des PRIMULACÉES.

27 (Pl. 19). GYROSELLE DE VIRGINIE (*Dodecatheon meadia*, Lin.). — Réduite de plus de moitié.

- Fig. 1. Bouton.
- Fig. 2. Fleur épanouie, de grandeur naturelle.
- Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur dans laquelle on a tronqué la corolle.
- Fig. 4. Deux étamines enlevées avec les deux divisions de la corolle auxquelles elles sont opposées, prises dans le bouton très avancé.

Planches.

- Fig. 5. Une étamine, vue de côté pour montrer son insertion sur la corolle.
- Fig. 6. Une étamine non ouverte, vue par sa face intérieure.
- Fig. 7. Coupe transversale de l'anthere.
- Fig. 8. Pistil entier.
- Fig. 9. Son placentaire central couvert d'ovules, isolé et doublé.

Famille des **PLUMBAGINÉES.**

28 (Pl. 13). DENTELAIRE DU CAP (*Plumbago capensis*, Thunb.).

- Fig. 1. Bouton fermé.
- Fig. 2. Étamine vue de côté.
- Fig. 3. Base des organes sexuels très grossie.
- Fig. 4. Extrémité du style et stigmates.
- Fig. 5. Ovaire isolé et dénudé.
- Fig. 6. Coupe longitudinale de l'ovaire pour montrer la position de l'ovule sur son long support, et la production qui descend du haut de la cavité ovarienne.
- Fig. 7. Ovule isolé avec son support fortement grossi.
- Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 9. Diagramme de la fleur.

Sous-division des EUMONOPÉTALÉES-HYPOGYNES.

Section des **Anisandrées.**

Famille des **LABIÉES.**

29 (Pl. 26). SAUGE A FLEURS LARGES (*Salvia patens*, Benth.). — Réduite de moitié.

- Fig. 1. Fleur entière, de grandeur naturelle.
- Fig. 2. Corolle entière dénudée pour montrer l'étranglement de son tube.
- Fig. 3. Calice.
- Fig. 4. Pistil et étamine montrant leur insertion sur la corolle, qui a été fendue, étalée et tronquée.
- Fig. 5, 6. Loge fertile de l'anthere prise dans un bouton long de 15 millimètres.
- Fig. 7. Partie inférieure des deux étamines montrant les filets et les deux loges stériles.
- Fig. 8. Coupe transversale de la loge fertile.
- Fig. 9. Ovaire entier sur son gros disque charnu jaune.
- Fig. 10. Stigmate jeune, grossi.
- Fig. 11. Coupe longitudinale d'une loge pour montrer l'ovule dans sa position naturelle. On a un peu exagéré l'espace qui existe autour de l'ovule.

Famille des **ACANTHACÉES.**

30 (Pl. 32). STROBILANTHE DE SABINE (*Strobilanthes sabiniana*, Nees). Réduit de moitié environ.

- Fig. 1. Fleur entière avec ses bractées, légèrement grossie.

Planches.

- Fig. 2. Corolle dont on a enlevé la partie antérieure pour montrer les étamines et le style.
Fig. 3. Bouton vu par dessus pour montrer la préfloraison de la corolle.
Fig. 4. Calice.
Fig. 5. Anthère vue de face.
Fig. 6. Anthère vue de profil.
Fig. 7. Anthère vue par le sommet.
Fig. 8. Ovaire entier, un peu plus que triplé.
Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, où l'on a conservé les ovules dans leur position naturelle. La cloison n'est complète que dans le bas.
Fig. 10. Coupe transversale de l'ovaire menée vers sa partie supérieure.
Fig. 11. Coupe transversale de l'ovaire menée vers le bas, là où existe la cloison.

Famille des GESNÉRACÉES

31 (Pl. 7). GLOXINIE CAULESCENTE (*Gloxinia caulescens*, Lindl.).

- Fig. 1. Fleur entière.
Fig. 2. Fleur dont on a enlevé la corolle.
Fig. 3. Fleur coupée longitudinalement, et dont la corolle a été enlevée en grande partie.
Fig. 4, 5. Anthère vue de face et de côté.
Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire.
Fig. 7. Ovule.

Famille de SCROPIHULARINÉES.

32 (Pl. 36). PAULOWNIA IMPÉRIAL (*Paulownia imperialis*, Sieb. et Zucc.). Réduit au quart.

- Fig. 1. Tube de la corolle ouvert et étalé pour montrer les étamines.
Fig. 2. Fleur dans laquelle on a enlevé la corolle et rabattu un lobe du calice afin de montrer le pistil.
Fig. 3. Stigmate grossi.
Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.
Fig. 5. Fragment de la membrane de l'aile de la graine, grossi à 50 diamètres.
Fig. 6. Capsule mûre, et s'ouvrant déjà, de grosseur naturelle.
Fig. 7. Graine mûre, grossie huit fois.
Fig. 8. Coupe longitudinale de la graine, montrant du dehors au dedans; le test prolongé en aile, le tégument interne brun, l'albumen, l'embryon
Fig. 9. Coupe transversale de la graine.
Fig. 10. Embryon isolé.

Section des **Isandrées.**

Famille des CONVULVULACÉES

33 (Pl. 5). LISERON DES JARDINS (*Pharbitis hispida*, Choisy). Diverses variétés.

Planches.

Famille des **ASCLÉPIADÉES.**

34 (Pl. 12). **STAPÉLIE PANACHÉE** (*Stapelia variegata*, Lin.).

Fig. a. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. b, c. Détails.

Sous-division des EUMONOPÉTALÉES-PÉRIGYNES.

Famille des **RUBIACÉES.**

35 (Pl. 14). **MANETTIA BICOLORE** (*Manettia bicolor*).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Corolle ouverte et étalée.

Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur dans laquelle on n'a conservé que la base de la corolle.

Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe longitudinale d'une loge fortement grossie.

Fig. 6. Un placentaire entier chargé d'ovules.

Fig. 7, 8. Ovule vu par le dos et de profil.

Famille des **GOODENIACÉES.**

36 (Pl. 34). **LESCHENAULTIE ÉLÉGANTE** (*Leschenaultia formosa*, R. Br.).

Fig. 1. Fleur entière vue un peu par dessus et de face.

Fig. 3. Fleur entière vue de profil.

Fig. 2. Fleur entière vue par son côté inférieur fendu.

Fig. 4. Calice et organes sexuels d'une fleur épanouie.

Fig. 5. Organes sexuels d'un bouton fermé; le stigmate est encore logé sous la voûte formée par les anthères.

Fig. 6. La poche stigmatique, ou l'indusie du même bouton entièrement béante pour recevoir le pollen.

Fig. 7. Même partie de la fleur ouverte, dont les deux lèvres se sont rapprochées après l'entrée du pollen.

Fig. 9. Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie.

Fig. 10. Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie, vue par dessus.

Fig. 8. Anthère ouverte.

Fig. 11. Coupe verticale de l'indusie très grossie. On voit intérieurement la coupe du tissu stigmatique.

Fig. 12. Ovaire entier un peu plus que doublé.

Fig. 13. Coupe transversale du même, grossie.

Fig. 14. Grain de pollen à sec, grossi de 230 diamètres.

Famille des **COMPOSÉES.**

37 (Pl. 6). Diverses variétés de **DAHLIAS** cultivés.

INDEX

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

ALPHABETICALLY BY AUTHOR

ADAMS, JOHN QUINCY

1. Adams, John Quincy, 1768-1848

2. Adams, John Quincy, 1768-1848

3. Adams, John Quincy, 1768-1848

4. Adams, John Quincy, 1768-1848

5. Adams, John Quincy, 1768-1848

6. Adams, John Quincy, 1768-1848

7. Adams, John Quincy, 1768-1848

8. Adams, John Quincy, 1768-1848

9. Adams, John Quincy, 1768-1848

10. Adams, John Quincy, 1768-1848

ADAMS, JOHN QUINCY

11. Adams, John Quincy, 1768-1848

12. Adams, John Quincy, 1768-1848

13. Adams, John Quincy, 1768-1848

14. Adams, John Quincy, 1768-1848

15. Adams, John Quincy, 1768-1848

16. Adams, John Quincy, 1768-1848

17. Adams, John Quincy, 1768-1848

18. Adams, John Quincy, 1768-1848

19. Adams, John Quincy, 1768-1848

20. Adams, John Quincy, 1768-1848

21. Adams, John Quincy, 1768-1848

22. Adams, John Quincy, 1768-1848

23. Adams, John Quincy, 1768-1848

24. Adams, John Quincy, 1768-1848

25. Adams, John Quincy, 1768-1848

26. Adams, John Quincy, 1768-1848

27. Adams, John Quincy, 1768-1848

28. Adams, John Quincy, 1768-1848

29. Adams, John Quincy, 1768-1848

30. Adams, John Quincy, 1768-1848

ADAMS, JOHN QUINCY

31. Adams, John Quincy, 1768-1848



